

## Tapirus terrestris



Tapir amazonico – Sachavaca

### Estado de conservación



### Clasificación científica

Dominio: Eucariota  
Reino: Animalia  
Filo: Chordata  
Clase: Mammalia  
Orden: Perissodactyla  
Familia: Tapiridae  
Género: Tapirus  
Especie: T. terrestris

### Nombre Científico

#### Tapirus terrestris

(Linnaeus, 1758)

El tapir sudamericano se puede encontrar cerca del agua en la selva amazónica y la cuenca del río en América del Sur, al este de los Andes. Su distribución geográfica se extiende desde Venezuela, Colombia y las Guayanas en el norte hasta Brasil, Argentina y Paraguay en el sur, hasta Bolivia, Perú y Ecuador en el oeste. Aunque se encuentra en una amplia variedad de bosques húmedos tropicales y subtropicales, bosques secos y pastizales y sabanas húmedas, la mayor parte (aproximadamente el 50%) de su área de distribución es la selva amazónica.<sup>26</sup>

T. terrestris es de color marrón oscuro, más pálido en la cara y tiene una cresta baja y erecta que va desde la coronilla hasta la parte posterior del cuello. Las orejas redondas y oscuras tienen bordes blancos distintivos. Los tapires recién nacidos tienen un pelaje de color marrón oscuro, con pequeñas manchas blancas y rayas a lo largo del cuerpo. El tapir sudamericano puede alcanzar una longitud corporal de 1.8 a 2.5 m (5.9 a 8.2 pies) con una cola corta y rechoncha de 5 a 10 cm (2.0 a 3.9 pulgadas) y un peso promedio de alrededor de 225 kg (496 lb). Se ha informado que el peso adulto oscila entre 150 y 320 kg (330 a 710 lb). Mide entre 77 y 108 cm (30 y 43 pulgadas) en el hombro.<sup>27</sup>

T. terrestris es un excelente nadador y buceador, pero también se mueve rápidamente en tierra, incluso en terrenos accidentados y montañosos. Tiene una vida útil de aproximadamente 25 a 30 años. En la naturaleza, sus principales depredadores son los cocodrilos y los grandes felinos, como el jaguar y el puma, que suelen atacar a los tapires por la noche, cuando los tapires abandonan el agua y duermen en la orilla del río. El tapir sudamericano también es atacado por la anaconda verde (*Eunectes murinus*). Se sabe que T. terrestris corre hacia el agua cuando tiene miedo de ponerse al descubierto.<sup>28</sup>

### Dieta

El tapir sudamericano es un herbívoro. Utilizando su nariz móvil, se alimenta de hojas, brotes y pequeñas ramas que arranca de árboles, frutos, pastos y plantas acuáticas. También se alimentan de la gran mayoría de semillas que se encuentran en la selva tropical. Esto se sabe porque la dieta se estudia a través de la observación de la navegación, el análisis de las heces y el estudio del contenido del estómago.<sup>29,30</sup>